

CADERNO DE PROVA

Município de Fraiburgo
Edital 001/2017-PMF

<http://concursofraiburgo.fepese.org.br>

S16 | Médico Psiquiatra



Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Após terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



25 de junho



30 questões



13h10 às 16h10



3h de duração*

Língua Nacional

5 questões

1. Leia o texto.

De que é feito um texto? Fragmentos originais, montagens singulares, referências, acidentes, reminiscências, empréstimos voluntários. De que é feita uma pessoa? Migalhas de identificação, imagens incorporadas, traços de caráter assimilados, tudo (se é que se pode dizer assim) que se chama o eu.

Michel Schneider. *Ladrões de palavras*. Campinas. Editora da Unicamp. 1990.

Sobre o texto é correto afirmar.

1. É feita uma analogia entre a construção de um texto e a “construção” de uma pessoa.
2. Há, no texto, dois questionamentos. Ambos são respondidos pelo próprio texto.
3. As expressões sublinhadas no texto exercem a mesma função sintática, a saber: objeto indireto.
4. A frase colocada entre parênteses apresenta um pronome oblíquo em próclise.
5. As palavras “empréstimos e escrevêsseis” são acentuadas graficamente pela mesma razão: ambas são proparoxítonas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Classifique as orações destacadas na coluna 2 com as coordenadas discriminadas na coluna 1.

Coluna 1 Coordenada

1. sindética aditiva
2. sindética adversativa
3. sindética alternativa
4. sindética conclusiva
5. sindética explicativa
6. assindética

Coluna 2 Orações

- () O médico atendia no hospital, os professores escreviam na biblioteca.
- () Havia uma multidão, mas não existia tumulto.
- () “Deixa em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa”.
- () Sou especialista, logo, só posso atender a casos específicos.
- () Siga o mapa ou peça informação nos postos.
- () O rapaz despediu-se de mim e tomou a estrada rumo à sua casa.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 • 3 • 4 • 5 • 6 • 2
- b. () 2 • 6 • 5 • 4 • 1 • 3
- c. () 4 • 6 • 2 • 1 • 3 • 5
- d. () 6 • 2 • 4 • 3 • 5 • 1
- e. (X) 6 • 2 • 5 • 4 • 3 • 1

3. Assinale a alternativa em que a predicação verbal está **corretamente** identificada entre parênteses.

- a. () No hospital, todos gostavam dele. (intransitivo)
- b. () As frutas despencaram das árvores. (transitivo direto e indireto)
- c. () Os professores estavam na sala de aula. (de ligação)
- d. (X) O povo não confiava mais em seu governo, naquele país distante. (transitivo indireto)
- e. () O jornal da cidade de Fraiburgo dedicou uma página inteira ao episódio com os grevistas. (transitivo direto)

4. Leia o poema de Sérgio Capparelli.

Menina na janela
A lua é uma gata branca,
mansa,
que descansa entre as nuvens.

O Sol é um leão sedento,
mulambento,
que ruge na minha rua.

[...]

Sobre o texto é correto afirmar:

1. As palavras sublinhadas são adjuntos adnominais.
2. As expressões “uma gata” e “um leão” são núcleos de predicativo dos sujeitos “lua” e “Sol”, respectivamente.
3. As frases “que descansa entre as nuvens” e “que ruge na minha rua” têm a mesma classificação, a saber: subordinadas substantivas apositivas.
4. A expressão “na minha rua” é um adjunto adverbial.
5. A expressão “entre as nuvens” é um complemento do verbo “descansar”, por isso classificada como objeto direto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.

5. Identifique as afirmativas (em parênteses) verdadeiras (V) e as falsas (F) em cada uma das frases abaixo:

- () Vou colocar minha rúbrica neste documento para que não haja fraudes. (presença de vício de linguagem)
- () O policial entrevistou rapidamente e o tumulto cessou. (frase escrita de acordo com a norma culta)
- () Sempre me ponho à pensar para que servem as leis neste país; vou me reportar à Sua Excelência, o senhor juiz, para fazer meu protesto. (crase usada com correção)
- () Enquanto não via, sofria; agora que sabe de tudo, sofre mais ainda, pois a consciência do erro o atormenta. (frase pontuada corretamente)
- () Aos inimigos, não lhes daremos o prazer da vingança. (o termo sublinhado é um objeto indireto pleonástico)

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•F•F•V
- b. (X) V•F•F•V•V
- c. () F•V•F•V•V
- d. () F•F•V•V•V
- e. () F•F•V•V•F

Temas de Atualidade

5 questões

6. Fraiburgo é famosa por seus vastos pomares de maçã, principalmente dos tipos:

- a. (X) Gala e Fuji.
- b. () Gala e Granny Smith.
- c. () Arkansas Black e Granny Smith.
- d. () Granny Smith e Red Delicious.
- e. () Red Delicious e Fuji.

7. Em 2016, os Jogos Olímpicos foram sediados pela primeira vez no Brasil, contemplando quarenta e duas modalidades esportivas, conforme divulgado pelo portal oficial do Governo Federal sobre os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos (www.brasil2016.gov.br).

Assinale a alternativa que contém as cinco modalidades em que o Brasil estreou em Jogos Olímpicos na edição do Rio 2016:

- a. () Atletismo, Badminton, Esgrima, Ginástica de Trampolim e Rugby.
- b. () Basquete, Golfe, Tiro com arco, Tiro Esportivo e Rugby.
- c. (X) Badminton, Ginástica de Trampolim, Golfe, Hóquei sobre grama e Rugby.
- d. () Badminton, Esgrima, Golfe, Judô e Hóquei sobre grama.
- e. () Golfe, Esgrima, Hóquei sobre grama, Nado Sincronizado e Rugby.

8. O rompimento da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billinton, é considerado o pior acidente da mineração brasileira, com impactos ambientais incalculáveis e, em alguns casos, irreversíveis.

Sobre essa tragédia, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Atingiu diversos municípios no Estado de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, resultando na destruição completa da cadeia alimentar do ambiente aquático do Rio Doce.
- b. () Atingiu apenas o município de Mariana, no Espírito Santo, e resultou na morte de 19 pessoas e em outras centenas de desabrigados.
- c. () Atingiu diversos municípios dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, sem vítimas fatais, mas com impactos irreparáveis ao equilíbrio e à biodiversidade da região.
- d. (X) Atingiu principalmente o município de Mariana, em Minas Gerais, e resultou na morte de milhares de peixes, no assoreamento de rios, na destruição da mata ciliar, entre outros danos ambientais.
- e. () Atingiu diversos municípios às margens do Rio Doce no Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, não afetando o Oceano Atlântico em virtude da rápida ação de contenção proposta pelas entidades competentes.

9. Em relatório das Nações Unidas, a guerra civil da Síria foi classificada como “grande tragédia do século 21”.

Sobre a Síria e esse conflito, é **incorreto** afirmar:

- a. () Apesar de ter assinado a Convenção de Armas Químicas, evidências apontam para o uso desse tipo de armamento pelo governo sírio.
- b. (X) De caráter político, a guerra civil na Síria não envolve divergências religiosas.
- c. () Sucedendo seu pai Hafez al-Assad, Bashar al-Assad está à frente do governo Sírio desde 2000.
- d. () Na tentativa de fugir do conflito, milhares de sírios buscam refúgio em outros países, incluindo o Brasil.
- e. () A guerra civil da Síria iniciou-se como uma revolta popular contra a forte repressão do líder do governo.

10. A Lei 13.185, aprovada em 6 de novembro de 2015, institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullying) que, conforme texto original, constitui-se “todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas”.

Entre as possíveis aplicações dessa lei, **não** caracteriza o *bullying*:

- a. () pilhérias.
- b. () insultos pessoais.
- c. () grafites depreciativos.
- d. () apelidos pejorativos.
- e. (X) estupro.

Temas de Saúde Pública

10 questões

11. Nos meios diagnósticos para a investigação de insuficiência renal, assinale a alternativa que apresenta os exames laboratoriais que analisam **corretamente** a avaliação funcional com a taxa de filtração glomerular.

- a. () Proteinúria e albuminúria.
- b. () Ca, fosfatos e vitamina D sérica.
- c. (X) Creatinina, depuração da creatinina, clearance de creatinina.
- d. () Sedimento urinário para hematuria, leucocitúria, nitrato e cilindúria.
- e. () Ureia, bicarbonato sérico, potássio e sódio séricos.

12. Para o diagnóstico sorológico da hepatite B na fase aguda, o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo vírus da hepatite B e que declina rapidamente é o:

- a. (X) HBsAg.
- b. () HBeAg.
- c. () Anti-HBe.
- d. () Anti-HBc IgM.
- e. () Anti-HBc IgG.

13. Nos exames laboratoriais rotineiramente utilizados para o diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV, os testes utilizados para detectar anticorpos anti-HIV em indivíduos com idade acima de 2 anos são:

- a. () Contagem de células T CD4+ em sangue periférico e carga viral.
- b. () Contagem da carga viral total e dosagem de PCR específico.
- c. () Testes de confirmação sorológica de Imunofluorescência Indireta (IFI).
- d. () Testes de confirmação sorológica Western Blot (WB).
- e. (X) Teste 1 e teste 2, com princípios metodológicos e/ou antígenos diferentes. Pelo menos um deles deve ser capaz de detectar anticorpos anti-HIV-1 e anti-HIV-2.

14. A morte encefálica será caracterizada através da realização de exames clínicos e complementares durante intervalos de tempo variáveis, próprios para determinadas faixas etárias.

Em adultos ela deve ser:

- a. () A cada 4 horas.
- b. () A cada 48 horas.
- c. () A cada 72 horas.
- d. (X) De 6 em 6 horas.
- e. () De 12 em 12 horas.

15. Na elaboração do atestado médico, o médico assistente poderá fornecer todas as informações listadas abaixo, **exceto**:

- a. () Registrar os dados de maneira legível.
- b. (X) Estabelecer rotineiramente o diagnóstico e a correspondente codificação na CID-10.
- c. () Estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente.
- d. () Identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho Regional de Medicina.
- e. () Especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a recuperação do paciente.

16. Na emissão de atestado de óbito, o médico intervencionista, quando envolvido em atendimento que resulte em óbito, de suposta causa violenta ou não natural (homicídio, acidente, suicídio, morte suspeita), deverá obrigatoriamente:

- a. (X) Constatar o óbito, mas não atestá-lo.
- b. () Solicitar parecer de outro médico envolvido no atendimento e atestar o óbito conjuntamente.
- c. () Realizar autópsia no próprio hospital para emissão do atestado de óbito.
- d. () Emitir atestado de óbito normalmente, uma vez que o paciente encontrava-se sob seus cuidados.
- e. () Atestar o óbito constando somente como morte violenta, sem outras comorbidades associadas.

17. O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui um moderno modelo de organização dos serviços de saúde que tem como uma de suas características primordiais valorizar o nível municipal.

Nesse nível, a porta de entrada para os serviços de saúde tem se consolidado por meio do(a):

- a. () Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
 - b. (X) Estratégia de Saúde da Família (ESF).
 - c. () Atenção primária de Hospitais Universitários.
 - d. () Atenção secundária em hospitais regionais.
 - e. () Atenção secundária em ambulatório de especialidades.
-

18. A Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas da Saúde definiram os princípios e as diretrizes que regem o SUS no Brasil.

Um dos grandes avanços na implantação do SUS foi "...garantir o acesso aos serviços de saúde a toda a população em condições de igualdade, entretanto mantendo uma discriminação positiva em casos especiais em que a prioridade tem de ser dada a quem tem mais necessidades..."

Essa Diretriz é a:

- a. () Igualdade.
- b. () Integralidade.
- c. () Universalidade.
- d. () Hierarquização.
- e. (X) Equidade.

19. Os Indicadores de Saúde revelam a situação de saúde da população ou de um indivíduo.

A morbidade é frequentemente estudada segundo quatro indicadores básicos:

- a. () A mortalidade geral, a mortalidade específica, letalidade e infectividade.
 - b. () A mortalidade geral, a mortalidade por causa, esperança de vida e a gravidade.
 - c. (X) A incidência, a prevalência, a taxa de ataque e a distribuição proporcional.
 - d. () A severidade, a vulnerabilidade, a incidência e a distribuição proporcional.
 - e. () A resistência, a imunidade, a susceptibilidade e a virulência.
-

20. No protocolo de morte encefálica para a viabilização da doação de órgãos, é fundamental para a sua caracterização:

- a. () Que os exames clínicos constatem apneia e dissociação eletromecânica no ECG.
- b. () Que os exames complementares demonstrem apenas a ausência de atividade elétrica cerebral.
- c. () Que os exames complementares demonstrem apenas a ausência de perfusão sanguínea cerebral, mas com atividade reflexa medular.
- d. (X) Que a morte encefálica seja em consequência de processo irreversível e de causa conhecida com arretividade supraespinal.
- e. () Que os exames clínicos constatem coma aperceptivo e ausência de atividade reflexa medular.

Conhecimentos Específicos

10 questões

21. Sobre os Transtornos de Pânico, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () O transtorno de pânico inicia com os ataques e costuma progredir para um quadro de agorafobia, no qual o paciente passa a evitar determinadas situações ou locais por causa do medo de sofrer um ataque.
- b. () Os primeiros ataques de pânico costumam vir sem qualquer aviso, de modo totalmente inesperado. Depois podem surgir a partir de um nível maior de ansiedade, a ansiedade antecipatória, ou serem precipitados pelo contato com algum tipo de situação.
- c. (X) A clomipramina é o medicamento com eficácia comprovada no maior número de casos, em ensaios duplo-cego, placebo-controlados, no tratamento do transtorno de pânico. A eficácia da imipramina também foi demonstrada, em menor número de ensaios duplo-cego, placebo-controlados.
- d. () A manifestação central do transtorno de pânico é o ataque de pânico, um conjunto de manifestações de ansiedade com início súbito, rico em sintomas físicos e com duração limitada no tempo, em torno de dez minutos. Os sintomas típicos são: sensação de sufocação, de morte iminente, taquicardia, tontei-ras, sudorese, tremores, sensação de perda do controle ou de “ficar louco”, alterações gastrointestinais.
- e. () A evitação fóbica no transtorno de pânico costuma ser vencida somente de modo gradual, à medida que o paciente passa a enfrentar situações que evitava. Nesse processo, o médico pode trabalhar com o paciente, estabelecendo, por exemplo, uma lista de situações a serem enfrentadas, hierarquizadas de acordo com o nível de dificuldade.

22. Sobre a Depressão, assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () A prevalência anual na população em geral varia de 3 a 11%.
- b. (X) Em serviços de cuidados primários e outros serviços médicos gerais, são diagnosticados 30 a 50% dos casos de depressão.
- c. () A prevalência de depressão é duas a três vezes mais frequente em mulheres do que em homens.
- d. () Aproximadamente 80% dos indivíduos que receberam tratamento para um episódio depressivo terão um segundo episódio ao longo de suas vidas.
- e. () A depressão foi estimada como a quarta causa específica nos anos 90 de incapacitação através de uma escala global para comparação de várias doenças. A previsão para o ano 2020 é a de que será a segunda causa em países desenvolvidos e a primeira em países em desenvolvimento.

23. Sobre a Tricotilomania (TTM), assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () É considerado um transtorno do controle de impulsos.
- b. () Alguns autores sugerem que a idade de começo dos sintomas para arrancar o cabelo é bimodal (infância/adolescência e fase adulta).
- c. () A terapia farmacológica que recebeu maior apoio para o tratamento de TTM foi a clomipramina, enquanto são informados resultados mistos para os ISRS.
- d. () Há o relato de que aproximadamente 48% dos pacientes com TTM, depois do ato de arrancar cabelo, ocuparam-se com comportamentos orais, como correr o cabelo entre os lábios, morder e arrancar a raiz ou comer o fio ou parte dele, o que é chamado de tricofagia.
- e. (X) Estudos clínicos iniciais sugeriam que a TTM era extremamente rara; entretanto, estudos em populações não clínicas mais recentes encontraram uma taxa de prevalência em torno de 8%.

24. Sobre o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), assinale a alternativa **incorreta.**

- a. () O sintoma principal é a expectativa apreensiva ou preocupação exagerada, mórbida.
- b. () O início do TAG é insidioso e precoce. Os pacientes informam que sempre foram “nervosos”, “tensos”. A evolução se dá no sentido da cronicidade.
- c. () No TAG as manifestações de ansiedade oscilam ao longo do tempo, mas não ocorrem na forma de ataques, nem se relacionam com situações determinadas.
- d. (X) O TAG tem recebido pouca atenção dos pesquisadores em psicofarmacologia pediátrica. Em estudos abertos, observou-se melhora significativa dos sintomas, tanto com o uso de sertralina, como de fluoxetina. Pouco se sabe a respeito de benzodiazepínicos para TAG na infância; alguns autores recomendam o seu uso no lugar de tratamentos psicoterápicos.
- e. () As crianças com TAG apresentam medo excessivo, preocupações ou sentimentos de pânico exagerados e irracionais a respeito de várias situações. Estão constantemente tensas e dão a impressão de que qualquer situação é ou pode ser provocadora de ansiedade. São crianças que estão sempre muito preocupadas com o julgamento de terceiros em relação a seu desempenho em diferentes áreas e necessitam exageradamente que lhes renovem a confiança, que as tranquilizem.

25. Sobre o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), assinale a alternativa **incorreta.**

- a. (X) Existe farta evidência sobre a eficácia da abordagem cognitivo-comportamental e da psicoterapia dinâmica breve no TEPT em crianças e adolescentes.
- b. () O TEPT tem sido evidenciado como um fator de risco para o desenvolvimento posterior de patologias psiquiátricas.
- c. () O diagnóstico do TEPT na infância é feito quando, em consequência à exposição a um acontecimento que ameace a integridade ou a vida da criança, são observadas alterações importantes no seu comportamento, como inibição excessiva ou desinibição, agitação e reatividade emocional aumentada, hipervigilância, além de pensamentos obsessivos com conteúdo relacionado à vivência traumática (em vigília e em pesadelos durante o sono).
- d. () Os sintomas relativos à repetição da experiência traumática são acompanhados de considerável sofrimento, que a maioria das vítimas busca evitar, afastando-se de qualquer estímulo que possa desencadear o ciclo das lembranças traumáticas.
- e. () As possibilidades de tratamento psicoterápico vão desde o individual ao tratamento grupal. Algumas situações devem ser tratadas individualmente conforme a experiência vivida pelo paciente. No entanto, há vantagens no tratamento em grupo para vítima de TEPT, tais como: diminuir a sensação de isolamento; fornecer apoio social; ajudar a confirmar e normalizar sentimentos em relação ao trauma; compartilhar técnicas de manejo e enfrentamento; proporcionar um ambiente seguro para o desenvolvimento de vinculação afetiva; e poder ajudar aos participantes a atribuir significado diferente ao evento traumático.

26. Sobre a Esquizofrenia, assinale a alternativa incorreta.

- a. () Os primeiros sinais e sintomas da doença aparecem mais comumente durante a adolescência ou o início da idade adulta. Apesar de poder surgir de forma abrupta, o quadro mais frequente se inicia de maneira insidiosa.
- b. (X) Alucinações e delírios são frequentemente observados em algum momento durante o curso da esquizofrenia. As alucinações visuais ocorrem em 50%, as auditivas em 15% e as táteis em 5% de todos os sujeitos, e os delírios em mais de 90% deles.
- c. () Sintomas prodrômicos pouco específicos, incluindo perda de energia, iniciativa e interesses, humor depressivo, isolamento, comportamento inadequado, negligência com a aparência pessoal e higiene, podem surgir e permanecer por algumas semanas ou até meses antes do aparecimento de sintomas mais característicos da doença.
- d. () O termo transtorno do pensamento refere-se a uma doença no conteúdo, assim como na forma dos pensamentos do indivíduo. Os transtornos do conteúdo do pensamento são os delírios. Os transtornos na forma de pensamento podem ser subdivididos em duas categorias: perturbação intrínseca do pensamento e transtorno na forma em que os pensamentos são expressos na linguagem e na fala.
- e. () Os distúrbios do comportamento na esquizofrenia incluem comportamento grosseiramente desordenado e comportamento catatônico. A catatonia é definida como um conjunto de movimentos, posturas e ações complexas cujo denominador comum é a sua involuntariedade. Os fenômenos catatônicos incluem: estupor, catalepsia, automatismo, maneirismos, estereotipias, fazer posturas e caretas, negativismo e ecopraxia. Foram encontrados sintomas catatônicos entre 5 e 10% dos pacientes com esquizofrenia.

27. Sobre Transtornos de Personalidade (TP) Borderline e Antissocial, assinale a alternativa incorreta.

- a. () Na população em geral, as taxas dos TP podem variar de 0,5% a 3%.
- b. () No TP Borderline, sua impulsividade pode ser dependente da presença de um estado emocional negativo.
- c. () Compreendendo esses transtornos como reais transtornos mentais, pode-se dizer que as pessoas acometidas por esse distúrbio apresentam padrões profundamente entranhados, inflexíveis e mal-ajustados de relacionamento e percepção do ambiente e de si mesmos. Com grande frequência, não percebem seus "sintomas" como prejudiciais a si ou aos outros e, por causa disso, não costumam buscar ajuda profissional, sendo também considerados, muitas vezes, irrecuperáveis.
- d. () Alguns autores acreditam que fatores comportamentais na infância e a presença de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) poderiam predispor o indivíduo ao desenvolvimento de transtornos da personalidade, pois dentro do modelo cognitivo, o comportamento antissocial é uma estratégia filogeneticamente determinada para facilitar a sobrevivência, e onde cada pessoa age motivada por um sistema de controle interno que regula suas percepções e respostas ao meio ambiente.
- e. (X) Segundo a teoria biossocial, pessoas com TP Antissocial são caracterizadas por uma combinação de vulnerabilidade emocional e desequilíbrio afetivo. A vulnerabilidade emocional envolve um baixo limiar para a resposta emocional, envolvendo respostas intensas e duradouras a estímulos emocionalmente sugestivos. O desequilíbrio afetivo refere-se à inabilidade de controlar ou modular as experiências emocionais.

28. Sobre a Eletroconvulsoterapia (ECT), assinale a alternativa **correta**.

- a. () Alguns estudos afirmam que a ECT deve levar a efeitos neuroprotetores e neurotrópicos.
- b. () Sua taxa de mortalidade gira em torno de 1 a 4 complicações graves por 100.000 tratamentos, sendo que a maior parte das intercorrências é atribuída a doenças clínicas pré-existentes, como cardiopatias em pacientes idosos.
- c. (X) São contraindicações absolutas para a ECT: lesões intracranianas ou condições associadas a aumento da pressão intracraniana, história de acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio recente com descompensação cardíaca, hipertensão arterial sistêmica grave (principalmente se relacionadas à feocromocitoma), presença de fatores de risco para hemorragia intracraniana e qualquer condição associada a um escore de risco 4 ou 5 da American Society of Anesthesiologists (ASA).
- d. () Desde a sua introdução, a ECT passou por inúmeros aperfeiçoamentos técnicos. Entre estes, inclui-se o relaxamento muscular (com succinilcolina), anestesia de curta ação, pré-oxigenação, uso de estímulo elétrico mais efetivo, posicionamento unilateral dos eletrodos e monitoramento mais completo da convulsão.
- e. () O efeito adverso mais importante da ECT consiste no déficit de memória, que se apresenta como confusão pós-ictal, amnésia retrógrada e/ou anterógrada, ou, ainda, em uma minoria de pacientes, como um déficit de memória subjetivo de longa duração (difícil de detectar e quantificar objetivamente).

29. Sobre Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), assinale a alternativa **incorreta**.

- a. (X) A idade média de início do transtorno encontra-se entre 20 e 25 anos, emergindo, portanto, nos anos formativos da vida de um indivíduo, impactando seu desenvolvimento cognitivo e emocional e levando a dificuldades interpessoais, educacionais e financeiras que podem ter repercussões para a vida toda.
- b. () Indivíduos com TAB demonstram aumentos significativos na utilização de serviços de saúde ao longo da vida, se comparados a pessoas sem outras doenças psiquiátricas.
- c. () O TAB é a quarta maior causa de prejuízo funcional entre os transtornos neuropsiquiátricos, sendo superado apenas pelas depressões unipolares, transtornos associados ao uso de álcool e a esquizofrenia.
- d. () Estimativas de prevalência do TAB são consistentes em diferentes culturas e grupos étnicos, variando entre 0,4% e 1,6% em adultos.
- e. () Existe um risco consideravelmente aumentado de suicídio entre pessoas com TAB, 15-20 vezes maior do que aquele da população geral, sendo que 25%-60% dos pacientes tentam suicídio pelo menos uma vez na vida, e 4%-19% morrem por suicídio.

30. Sobre a Depressão Pós-Parto (DPP), assinale a alternativa **incorreta**.

- a. () A maioria dos estudos refere que a DPP atinge de 10% a 15% das mulheres.
- b. () A DPP geralmente inicia da quarta à oitava semana após o parto (por vezes mais tarde, mas ainda dentro do primeiro ano) e pode persistir por mais de um ano.
- c. () Os sintomas de DPP incluem irritabilidade, choro frequente, sentimentos de desamparo e desesperança, falta de energia e motivação, desinteresse sexual, alterações alimentares e do sono, sensação de ser incapaz de lidar com novas situações e queixas psicossomáticas.
- d. (X) A psicose pós-parto é considerada mais rara, afetando 1 a 2 em cada 10.000 mulheres, tendendo a apresentar uma maior incidência em primíparas.
- e. () São fatores de risco identificados para a DPP: baixa autoestima, problemas na situação conjugal e socioeconômica, além de gravidez não planejada ou não desejada.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>